

卷

八

吉慶堂



夫氣者水之
母血者氣所
化非氣無以
生血非血無
以養氣故
水者血之
源血者氣之
母也血不
通而氣不
化水不化而
血不流也

○浮腫

長方論曰婦人經水不通則化為血而血不通則化為水水斷絕後至四肢浮腫致小便不通者此為血閉不通而化為水流走四肢恐皆脾虛不能化水也用人參丸

薛氏曰按前論因飲食起居失養或因六淫七情之氣血不和而致此症者不可不察也

濟陰綱目卷之七

關中 武之望叔卿父著輯 西吳 費家琰子傅父訂正

西陵 汪 淇懌子箋評 天都 查 望于周父叅閱

○浮腫

夫氣者水之母血者氣所化非氣無以生血非血無以養氣若經水不通則血病血病氣亦病豈有水不通而能化血乎血不通而化水者乃是氣壅不能化血而成水也

良方論曰婦人經水不通則化為血血不通復化為水故先因經水斷絕後至四肢浮腫致小便不通名曰血分宜用椒仁丸若先因小便不通後身面浮腫致經水不通名曰水分宜葶藶丸經水不通而化為水流走四肢悉皆腫滿亦名血分其證與水證相類實非水也用人參丸

薛氏曰按前證或因飲食起居失養或因六淫七情失宜以致脾胃虧損不能生發統攝氣血乖違行失常道若先斷經後浮腫此

觀椒仁丸可
想矣

血凝成癥固
而致腫當知
此症

宣

腎虛則水不
利而散溢妄
行故用腎氣
丸加減

血化為水名曰血分宜椒仁丸治之若先浮腫後經水不通此水
化為血名曰水分宜用葶藶丸治之此屬形氣不足邪淫隧道必
用此藥以宜導其邪而佐以補轉元氣之劑庶使藥力有所仗而
行則邪自不能容而真氣亦不至於復傷矣大凡月水不通凝結
於內久而變為血瘕血水相并亦為水腫

李氏曰經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞門比水腫
更難治但能調其經則水自消小調經散葶藶丸先浮腫而後經
水不通名曰水分乃脾不能制血與水并浮飢肉為之虛腫經磬
丸通用腎氣丸水分君澤瀉加防己葶藶水通血分君牡丹皮加
半膝紅花有經閉脚腫者桑白皮散

治方

血凝成癥固而致腫當知此症
水則以利水
椒仁丸
治先因經水閉結後至四肢浮腫小便不通此化血為水

血既化而為水則以利水為先而行血溫血開結破氣又不可少者然非峻利氣悍之物不可故又佐之以大毒之藥

此必已試有成驗者讀之令人胆壯

無水病故先利水而又佐

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化為水

名曰血分

椒仁

續隨子

去皮研

甘遂

附子 炮

郁李仁

黑牽牛

五靈脂

研碎

當歸

吳茱萸

延胡索 各五錢

芫花

醋浸 石膏 各一錢

膽礬

信砒 各一錢

蜣毒

糯米炒黃 去頭翅足

斑猫

糯米炒黃 各十個

右為末 麴糊丸如豌豆大 每服一九 橘皮湯下。此方藥雖峻利所用不多若畏而不服有養病害身之患當治虛弱之人亦未見其有誤也

葶藶丸

治先因小便不利後至身面浮腫經水不通水化為血

名曰水分

以曰木者助
土以防水土也

濟世綱目

卷七

二

本草綱目

甜葶藶炒另研

續隨子去殼另研各五錢

乾笋末一兩

右為末。棗肉丸如桐子大。每服七丸。煎扁竹湯下。○如大便利

者。減續隨子。葶藶各一錢。加白朮五錢。

人參一名葶藶

治經脉不利。血化為水。流走四肢。悉皆腫滿。名

曰血分。其候與水相類。若作水治之。非也。宜用此方。

人參

當歸

大黃濕紙裏飯上蒸熱切炒

桂心

瞿麥穗

赤芍藥

白茯苓各半兩

葶藶炒另研一錢

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服十五丸至三十丸。空心米飲

下。

小調經散。

治敗血停積五臟。日久腐爛成水。變為浮腫。忌用利

水之藥。產後浮腫亦宜。

此重在敗血。故此忌用利水。所謂調經水自消。

當歸

甘草

細辛

鹿角

水之藥產後浮腫亦宜

當歸

赤芍藥

桔心各一兩

沒藥

琥珀

甘草各一錢

細辛

麝香各五分

右為末每服五分溫酒八薑汁調服

桑白皮散

治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐

臥不得

此係脚氣方借用也

桑白皮炒一錢

郁李仁炒一錢

赤茯苓二錢

水香

防已酒洗

大腹皮各五錢

蘇子

木通

檳榔

青皮各七分半

右剉一服加生薑三片水煎服

正腕散

治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便秘澀兼治

脾虛不能制水而氣不降者宜之

脚氣

白朮

川芎

水香

檳榔

甘草各七錢半 大腹皮 紫蘇 木瓜

陳皮 沉香 獨活各一兩

右咬咀每服三錢水煎食後服

大調經散 治榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿

大豆炒去皮一兩半 茯苓 真琥珀一錢

右為末每服一錢濃煎烏豆紫蘇湯下

大腹皮飲 治婦人血嬰重腹腫即真單腹脹也

大腹皮 防己 木通 厚朴 括蕓

黃蓍 枳殼 桑白皮 大黃 陳皮

五味子各等分

右坐每服一兩水煎去滓八酒少許服

此開胃門潔淨府法皆在氣分而不在于血不調增寒自汗乃邪在表也
血嬰之名甚新謂單腹脹如抱嬰癰之狀也然皆用行氣藥也黃蓍五味大黃又可以補氣而行血

飲散何狀
大黃甘遂湯
治婦人小腹脹滿如青黃狀小便微利而不墜也

散散何狀

甘遂懷藥也
恐太多

肝經之脉環
陰器故見証
如是而治法
亦如是也

大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如鼓狀小便微微而不通產後
者惟水與血并結血室也

大黃 半兩

甘遂 炮

阿膠 炒各二兩

右劉每服二錢水一盞煎七分服其血當下

前陰諸疾

論陰戶腫痛

良方論曰婦人疝瘕一名便癰一名便毒俗名瘡子或肝經濕熱
下注或鬱怒傷損脾肝其外證或兩拘小腹腫痛或玉門癰腫作
痛或寒熱往來增寒壯熱其內證或小便澀滯或腹內急痛或小
腹痞悶或上攻兩脇或哺熱重墜甚兩拘小腹腫痛肝經濕熱壅
滯也用龍膽瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛也用加味逍遙散及龍

以不閉腫虛
故宜補以脾
痛屬是故宜
涼

膽瀉肝湯加木香若紫投散血攻毒之劑則誤甚矣。○又曰婦人
陰腫因胞絡系虛風邪客之乘於陰部血氣相搏故也。○薛氏曰
婦人陰腫若氣血虛弱用補中益氣湯舉而補之肝經濕熱用龍
膽瀉肝湯瀦而清之。○李氏曰陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸者
用四物湯入乳香末同搗成餅安陰中立效。○陰腫痛極便秘欲
死者枳實散但腫痛者四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草如時
常陰腫者四物湯加藥木防風。○陰戶腫痛不閉者逍遙散十全
大補湯腫消不閉者補中益氣湯腫痛者加山梔牡丹皮。○濕痒
出水又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮芍藥生甘草
○潰爛者逍遙散。○陰戶腫痛不閉寒熱溺澀體倦少食者補中
益氣湯加升麻柴胡至一錢量八茯苓山梔。○陰戶不閉小便淋

九氣湯加升麻此木胡至一錢量八茯苓山梔。陰戶不開小便不利

○論陰痒生蟲

陰痒生虫當
與腸胃飲食

之虫不同仲

景曰風三虫

此當從風木

所化故治法

悉以清肝為

主

大全云婦人陰痒者是蟲蝕所為。三蟲在於腸胃之間。因臟虛。三

蟲動作。蝕於陰內。其蟲作熱。微則為痒。重者乃痛也。薛氏曰。前

證屬肝經所化。當用龍膽瀉肝湯。逍遙散。以主其內外。以桃仁研

粉和雄黃末。或鷄肝納陰中。以制其蟲。○一婦人胸膈不利。內熱

作渴。飲食不甘。肢體倦怠。陰中悶痒。小便赤澀。此鬱怒傷肝脾所

致。用歸脾湯。加山梔而愈。復因怒。患處并小腹脹痛。用小柴胡。加

山梔。芎藭。芍藥。痛止。用逍遙散。加山梔而愈。又因勞役。患處腫脹。

小便仍澀。用補中益氣。加山梔。茯苓。丹皮而痊。○一婦人陰內痛

痒。不時出水。食少體倦。此肝脾氣虛。濕熱下注。用歸脾。加丹皮。山

赤

梔子藥甘草主之而安。○一婦人陰內痒痛內熱倦怠飲食少思此肝脾鬱怒元氣虧損濕熱所致。用藥者歸米陳皮柴胡炒梔子前升麻芍藥丹皮茯苓而痛若陰中有蟲痒痛亦屬肝木以桃仁雄黃研納陰中以殺之。仍用清肝解鬱之藥有以雞肝納之者乃取蟲之法也。一方搗新桃葉綿裏納陰也日三兩易

此又謂脾胃濕熱下流而生虫者

李氏曰陰中生蟲。腐如小蛆者乃濕熱甚而心氣又鬱。氣血凝滯而生。宜藿香養胃湯補心湯。硫鯉丸外用生艾汁調雄黃末燒烟薰之。更用雄黃銳散納陰中。○陰中生細蟲痒不可忍。食入臟腑即死。令人發寒熱。與勞證相似。先以蛇床子煎湯洗淨拭乾。後用梓樹皮焙乾為末入枯礬四分之一。麝香少許。敷之立効。○如下疽主蟲。所下如柿汁臭穢及心中疔痛悶絕虛煩甚者不治。

若諸諸痛痒
人少食飯
而胃中
有客
名曰
或痛或痒
如虫

諸陰戶生瘡

若諸痛痒
陰若以瘡在
下部皆屬足
少陰

俱屬肝胆之
火少分虛寒
求治
以腫痛屬血
虛肝熱濕
痒為脾虛肝
熱○淋瀝屬

大全云婦人少陰脈數而滑者陰中有瘡名曰厲或痛或痒如蟲
行狀膿水淋漓亦有陰蝕幾盡者皆由心神煩鬱脾胃虛弱致血
氣流滯耳故經云諸痛瘕瘵皆屬於心又云陽明主肌肉治之當
補心養胃外以薰洗為導藥治之乃可○薛氏曰婦人陰中生瘡
乃七情鬱火傷損脾胃濕熱下注其外證有陰中舒出如蛇俗呼
陰挺有翻突如餅俗呼陰菌亦有如雞冠花亦有生諸蟲亦有腫
痛濕痒潰爛出水脹悶脫墜者其內證口乾內熱體倦經候不調
或飲食無味胸熱發熱胸膈不利脇肋不調小腹痞脹赤白帶下
小水淋漓其治法腫痛者宜用四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽
草濕痒者宜用歸脾湯加山梔牡丹皮柴胡淋瀝者宜用龍膽瀉

肝腎有熱○
腐潰屬肝脾
腫脫為不
足有火故其
立方如此

此即陰癰有
謂藥本一味
能治婦人癰
疔以其升舉
太陽之氣也
但與虛而下
墜者非宜

肝湯加白朮牡丹皮。潰腐者宜用加味逍遙散。腫悶脫墜者宜用
補中益氣湯加山梔牡丹皮佐以外治之法。

○陰挺下脫

大全云婦人陰挺下脫或因胞絡傷損或因子臟虛冷或因分娩
用力所致。○薛氏曰陰挺下脫當升補元氣為主。若肝脾鬱結氣
虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便瀼瀼用龍膽瀉肝湯。○
一婦人陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱脯熱似痒似痛
小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也
先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清肝火升脾氣更以
加味歸脾湯調理脾鬱外以生豬脂和藜蘆末塗之而收。○一婦
人陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋瀝小便瀼瀼久與龍膽瀉

肝湯分利濕熱。朝與補中益氣湯升補脾氣。諸證漸愈。再與歸脾湯加山梔川芎茯苓黃蘗間服。調理而愈。後因勞役。或怒氣下部濕痺。小水不利。仍用前藥即愈。

○論陰冷

良方云。婦人陰冷。因勞傷子臟。風冷客之也。○薛氏曰。陰冷屬肝。經有濕熱。外感風冷所致。若小便澀滯。或小腹痠痛。用龍膽瀉肝湯。若內熱寒熱。或經候不調。用加味逍遙散。若寒熱體倦。飲食少思。用加味四君子湯。若鬱怒發熱。少寐懶食。用加味歸脾湯。○一婦人陰中寒冷。小便黃澀。內熱寒熱。口苦脇脹。此因肝經濕熱。用龍膽湯祛利濕熱。用加味逍遙散調補氣血而安。○一婦人所患同前。更寒熱嘔吐。兩股腫痛。先用小柴胡加山梔一劑。寒熱嘔吐。

有一婦患此
每交感後輒
面黃如蠟外
終身不育

婦人陰中寒冷小便澄清

頓止次用龍膽瀉肝湯一劑頓消。一婦人陰中寒冷小便澄清

腹中亦冷飲食少思大便不實下元虛冷治以八味丸月餘飲食

漸加大便漸實又月餘諸證悉愈

○論交接出血作痛

薛氏曰：女人交接輒出血作痛此肝火動脾而不能攝血也用補

中益氣湯濟生歸脾湯若出血過多而見他證但用前藥調補肝

脾

○論傷丈夫頭痛

薛氏曰：女人交接傷丈夫頭痛當用補中益氣湯六味地黃丸以

滋化源為主

補遺局方來復丹治婦人與男子交接相傷因而四肢沉重頭痛

脈去

昏暈米飲吞下五十丸

○脉法

脉經曰少陰脉滑而數者陰中生瘡○少陰脉弦者白腸必挺核

○治陰戶腫痛

龍膽瀉肝湯治肝經濕熱下部兩拘腫欬作痛小便澀滯陰挺

如菡或出物如蟲等證

龍膽草酒炒

澤瀉各一錢

車前子炒

木通當歸酒拌

生地黄酒炒

山梔子炒

黃芩炒

生甘草各五分

右剉水煎服○玉門腫脹加木香

加味四物湯治陰戶腫痛

當歸

川芎

芍藥

生地黄

瀉肝而兼導赤為其子也
瀉肝而用利水肝主鍊瀉也龍胆山梔假以降火當補生地以滋肝陰生甘草緩肝之急炒黃芩助肝之氣

柴胡

山梔子

牡丹皮

龍膽草

右剉水煎服

九味柴胡湯

治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脇肋結核片

肝膽經部分一切疥癩或風熱結核癰癤並皆治之

柴胡

黃芩

炒各一錢

人參

山梔子

炒

半夏

龍膽草

炒

當歸

芍藥

炒

甘草

各五分

右剉水煎服

加味小柴胡湯

治肝經下部腫脹小便不利或寒熱往來或嘔

熱或胸脇作痛

柴胡

二錢

黃芩

炒一錢

人參

半夏

山梔子

牡丹皮

各七分

甘草

肝脾

加味逍遙散

治婦人

腫脾血虛

濕熱流注下部

陰內潰爛

痒痛

發熱肺熱寒熱等證

當歸

芍藥

白朮炒

茯苓

甘草

炙各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔

炒各五分

右剉水煎服外以鶴虱煎湯洗

菖蒲散

治婦人陰戶腫痛月水澀滯

菖蒲

當歸各一兩炒

秦艽

一兩

吳茱萸

製五錢

右為末每服五錢空心葱湯調下或水煎服

麻黃湯洗方

治婦人陰腫或瘡爛

麻黃

黃連

蛇床子

各一兩

牡艾葉

一兩

烏梅十箇

其妙又在麻黃以麻黃氣

陰戶屬厥陰腫痛則氣壅血聚故用此四味以行心肝之氣血耳尤妙在葱湯

悍能開喉而通氣也。艾葉燬其下以其瘡爛故又佐以連床烏梅云。

陰腫者肝木之風也。以助風瀉肝木之風邪。以艾葉溫厥陰之結氣。大戟瀉腫消毒。酸加之消熱腫。

如石者氣凝血滯也。厥陰

右判細以水一斗煮取五升去滓熱洗避風冷

經心錄方治婦人陰中腫痛不可忍

艾葉五兩 防風三兩 大戟二兩

右判細以水一斗煮取五升熱洗日三次宜避風冷

白礬散治婦人陰腫堅痛

白礬半兩 甘草半分 大黃一分

右為末水和如丸棗大綿裹內陰中日兩換以愈為度

黑白散治婦人陰中腫痛

小麥 朴硝 白礬 五倍子 葱白

右伴煎湯頻洗

根搗熨治婦人陰腫如石痛不可忍二便不利

右二味妙令香熟以絹袋盛之通身從上至下及陰腫處頻頻

之經環陰器
用此熨之是
行其氣耳

次精平肝熱
甘菊清肝熱
而散
馬鞭草散肝
血

陰痒總是心
肝之火游行

枳實

陳皮 各四兩

右二味炒令香熟以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻頻熨之冷則又換直至喉中覺枳實氣則痛止腫消便利矣

雜方 治婦人陰中腫痛

用枳實半觔切碎炒熟布裹包熨之冷即易 一方用枳殼

一方用鐵精粉傅上 一方以甘菊苗研爛百沸湯淋洗患

浸 一方用馬鞭草搗爛塗之

○治陰痒生蟲

大黃散 治婦人陰痒

大黃 微炒

黃芩

黃蓍 炙各一兩

赤芍藥

玄參

丹參

山茱萸

蛇床子 各半兩

治陰痒生蟲方

治陰痒生蟲方

十

右為細末。每服二錢。食前溫酒調服。

硫鱉丸

治陰中生蟲。亦治茄子疔。

大鱉一個。去頭皮。八硫黃一兩。黃泥固。用火煨。烟盡為末。

米糊丸如桐子大。每服二十丸。溫酒下。

廣濟方

療婦人陰痒不止。

蝟蛇膽

雄黃

硫黃

朱砂

硝石

蕪荑

各半

藜蘆

二錢

石為細末。以臘月豬脂和如膏。用故布作繩子。如指長一寸半。

以藥塗上。兩陰中。日一易之。易時宜用豬椒根三五兩。水煮稍

熱洗。乾拭內之。

方。治陰中生細蟲。痒不可忍。若食八臟腑即死。

生虫。孫穢惡。不潔。外治。無非殺虫。內治。無非清火。養陰。

先師云。一

思此。甘。用熱水。洗。擦。數次。

百方不効。後

陰。夫。住。至。山

東。食。小。米。飯

數。日。而。愈。導

亦。補。土。而。制

溫。濕。此。則

治。法。又。須。補

脾。氣。濕。矣。姑

試之。

右和一處。研勻。敷之。立効。

一婦固陰痒
不止不敢告
人曰請觀音
經夢二老嫗
教以甲吳萊
葉焙茶煎洗
而愈

梓樹皮

焙乾為末二錢

枯礬五分

麝香少許

右和一處研勻敷之立効

又方

桃仁雄黃研勻納陰中仍服清肝解鬱之藥

又方

蛇床子白礬煎水淋洗即止

又方

狼牙二兩蛇床子三兩以米三升煮汁沸熱洗

又方

取牛肝或豬肝截五寸繩繫內陰中半日蟲入肝取出立

効

又方

取鷄肝乘熱內陰中如有蟲當盡下

又方

新桃葉搗爛綿裹納陰中曰三兩易

又方

生艾汁調雄黃末燒烟薰之更用雄黃末納陰中

聖惠方

療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白多

齊集綱目

卷七陰痒生虫方

十一

氣思美食

用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末。旋黃黑以豬脂和以絹袋盛如常法納陰中至痛處即止蟲當自出。

崔氏療陰痒不可忍方

杏仁燒作灰。乘熱綿裹納陰中。日二易之。

又方蒜煮湯洗之。○一方用枸杞根煎湯洗。

又方小蘗不拘多少水煎作湯熱洗。日三次。

○治陰戶生瘡

補心湯治婦人陰戶生瘡名曰匿瘡或痛或痒如蟲行狀膿水

淋瀝陰蝕已盡治之當補心養血

人參

茯苓

前胡

半夏

湯泡川芎各七錢半

錢半

湯名補心我不知其所以
補心治陰瘡我不知其所以
以治惟問之

知者

此名養胃固
宜第以除中

生瘡而歸之

陽明經虛

以土失生氣

而自腐敗以

此而推則食

小米而陰虛

乃愈者亦此

意也

此方精妙

濕治重脾

陳皮

枳殼土炒蘇

桔梗

乾薑

甘草

各五錢

當歸

白芍藥

各兩

熟地黃

一兩半

右劉每服四錢加薑棗煎服○如濕熱有蟲者去薑蘇參梗四

味加苦參壯艾桃仁吳茱萸水炒黃連

集養胃湯

治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

藿香

薏苡仁

神麴

炒

烏藥

去木

砂仁

半夏

茯苓

白朮

人參

各五錢

葶澄茄

甘草

各三分半

右劉薑棗煎服

一方治陰內生瘡膿水淋瀝或痒痛

升麻

白芷

黃連

木通

平信司

卷之五

七

生肌乃太陰
陽明少陰厥
陰正法也

當歸

川芎

白朮

茯苓

右剉水煎服更用場腫湯浴洗

場腫湯 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草

乾漆 各三錢

生地黄

黃芩

當歸

川芎 各二錢

鼈甲 炙五分

右剉作一劑用水數碗煎數沸去滓時常洗患處

治陰瘡

薤白

川芎

黃芩

甘草

黃連

白芷

附子

礬石

雄黃 各六錢

右咬咀取豬脂四兩合煎傳之

治婦人陰瘡與男子妬精瘡大同小異方

蛇床子 研極

白朮 各一條

硫黃 各半

黃丹 枯白礬 篇蓄 藁本 荆芥

蛇床子 細研極 白蛇皮 一條 燒灰 硫黃 各半

右為細末另以荊芥蛇床子煎湯溫洗軟帛溲乾清油調塗如瘡濕乾末搽之

治疔瘡因月後便行房致成濕爛伏流陰道疔瘡遂生搔痒無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥也

黃蓍 鹽水 兔絲子 酒浸 沙苑蒺藜 炒

黑牽牛 赤石脂 龍骨

燕窩酒奇

右為末煉蜜丸桐子大每服二十丸燕窩蒸酒澄上清者吞下

黃芩湯洗方 療婦人陰中生瘡

活血清熱燥濕殺蟲

當歸 大黃 黃芩 川芎 雄黃

治血開結
中

雄黃散

右切以水五升取四升洗瘡日三度

礬石

各二分

黃連

一分此方中有云分者音作忿每一分二錢半也

雄黃

川芎

當歸

北細辛

川椒

藜蘆

辰砂

右為末綿裹兩陰中又傳外瘡止忌如常法

當歸

川芎

芍藥

甘草

各二兩

地榆

三兩

一方有蛇床子不用川芎

右細切以水五升煮取三升去滓熏洗日三夜二

又方

五倍子

甘草

滑石

黃丹

各等分

燥濕平肌

燥濕生肌

燥濕生肌

燥濕生肌

又肝開竅殺

右為末先以甘草湯洗然後傳之

肘後方。治婦人陰戶生瘡作痒或痛。

杏仁炒

雄黃

白礬各五錢

麝香二分

右為細末傳入陰中。一方單用硫黃研細傳之亦効。

銅綠散。治男婦陰部濕淹瘡。

五倍子五錢

白礬一錢

乳香五分

輕粉一字

銅綠少許

右為末洗淨瘡之。

麝香杏仁散。治婦人陰瘡。

麝香

少許

杏仁

不拘多少燒存性

右為細末如瘡口深用小絹袋子二個盛藥滿搽口臨上床灸

熱安在陰中立愈。

栢蛤散 治下疳濕疥

黃柏 以磁鋒刮末

蛤粉 各等分

右摻上即愈蓋黃柏去熱蛤粉燥濕故也

胃衆殺虫除熱

又方 平胃散加貫衆末每服二錢煮熟猪肝拌藥內陰戶數日可安

○治陰痔

治婦人陰中生痔九竅有肉突出者皆名爲痔

用烏頭七箇燒存性用小瓦罐盛醋淬之乘熱熏候通手

沃之良

肉突爲痔人當未讀烏頭醋洗亦所未知

洗方 治茄子疾

茄皮 白礬 馬椿頭根 朴硝

右煎水熏先

澤蘭

石灰炒少許

右煮水熏洗

傳藥 治茄子疾

朴硝爲末黃荆柴燒漚調敷或濃鐵漿水調傳

又方 治茄子疾 治茄子疾心躁連綿黃水易治白水難愈用

生枳殼爲散煎湯熏洗却用線帛包枳殼澤納八陰中即日

漸消

○治陰挺下脫

當歸散 治婦人陰中突出一物長五六寸名陰挺又名癰疽

當歸

黃芩

各一兩

牡蠣

一兩半

蛭皮

炙一兩

赤芍藥

五錢

右爲末每服二錢食前溫酒調下滾湯亦可如不應更以補中

此氣湯倍加升麻柴胡兼服之

又方 治陰挺

當歸 穿山甲 蒲黃炒各半兩 辰砂 一錢 麝香 少許

右為末 每服二錢 酒調下尤効

三葉丸 治陰中生一物所大牽引腰腹膨脹痛至甚不思飲食

皆因多服熱藥及煎炒或犯非理房事兼意淫不遂名陰挺

食茱萸 吳茱萸湯浸微炒 山茱萸肉 舶上懷香

白蒺藜 桔梗慢火炒 青皮去白各一兩 五味子

海藻洗焙 大腹皮酒洗晒乾 川練子去核 玄胡索各一兩二錢半

右為末 酒糊丸如桐子大 每服三十五丸 木通湯下 〇下虛加

川烏炮去皮肉桂去粗皮各一兩 腰腹痛甚加桃仁去皮尖

一方每服一錢生地黃湯調乃用金毛狗脊五倍子白礬石水湯

此是肝家藥

炒別研青皮去白、松實、生薑各一兩、真南木香、土錢半、服之。
一方每服三錢、生地黃湯調、仍用金毛狗脊、五倍子、白礬水湯
根、魚腥草、山黃連各一兩、為散、分作四服、以有諸症、確煎熱、預
以銀錫作一長小筒、下透確精、精上貫挺上、先熏後洗、立效、更
服白薇散、芙蓉花少許煎。

一捻金丸 服前藥未効、却用此

玄胡索 舶上懷香 吳茱萸 炒 川棟子 去核 青木香 各二兩

右為末、粳米飯糊丸、如桐子大、每服三十五丸、空心未通湯服、
又用梅花腦子半錢、錢孕粉一錢、水調刷上、如陰畔生瘰、以涼
血餘、每服三錢、加菱蓉花少許煎、空心服立効。

腦子辛寧
鐵粉以金

治婦人陰挺出下脫方

齊集綱目

卷七 治陰挺下脫方

十六

平肝散而制之誠治法之正也

桂心一方作川椒

吳茱萸一兩生用

戎鹽二兩

右藥並炒令色變搗羅為末以綿裹如指大內陰中日再易之甚妙

又方 川椒

川烏頭生用

白芨各半兩

右搗羅為末綿裹一錢內陰中深三寸腹中熱即止來日再用之

又方 蛇床子五兩

烏梅二枚

武叔卿先生著

以水五升煮取三升去滓稍熱洗之每日夜三五度用

又方 硫黃

烏鰂骨各半兩

搗羅為末傅之

又方

鐵精細研以羊脂調布裹炙熱熨之以瘡為度

又方

用羊脂煎入適令煖取塗上以鐵精傅之多少令調以火

紙布煖臍肚上漸塗內之然後未磁石酒服方寸七日三

熏洗法

用荆芥穗臭椿樹皮霍香葉煎湯熏洗即入

托藥 用草麻子葉有九角者好飛過白礬為末以紙片攤藥托

入

搽藥 先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬為末乾搽立効

敷藥 用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用草麻子研爛塗

上吸入如入即洗去

○治陰冷

五加皮浸酒方 治婦人癖瘦陰冷

五加皮 乾薑 丹參 蛇床子 熟地黃

搽是藥者濕之而地骨天

門又所以清
上而達下也

枸杞丸佳

杜仲各三兩

地骨皮

天門冬各一兩

鍾乳粉四兩

右剉碎以生絹袋盛用酒十五觔漬一宿每服一匙空心食前
飲之○一方用枸杞子無地骨皮

八味丸 治血弱不能榮養臟腑津液枯澀風寒客於子臟以致
陰寒

熟地黄半斤

山茱萸肉

乾山藥各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉各三兩

肉桂

附子各一兩

右爲末和地黃膏加煉蜜爲丸如桐子大每服七八十丸
食前白滾湯下

治婦人陰冷方

遠志

乾薑

蓮花各半兩

蛇床子

五味子各一兩

右搗羅為末。每用兼以兎糞塞陰門。用綿裹一錢。內陰中。熱煎為効。

又方。蛇床子 吳茱萸 甜葶藶各半兩 沒石子 一枚

右為末。綿裹。許大。內陰中。令腹內熱為度。

又方。蛇床子一兩 吳茱萸生用 一方用麝香

右為末。煉蜜。凡如酸棗大。以綿裹。納陰中。下惡物為度。

溫中坐藥。用蛇床子為末。白粉少許。和勻。如棗大。綿裹。納之。自

然。溫熱有効。

又方。吳茱萸。入牛膽中。令滿。陰乾百日。每取二十粒。研碎。帛裹。

納陰中。良久。如火熱。

治交接血作痛

千金方 治女人交接出血

桂心

伏龍肝各五錢

右為末酒服方寸匕瘥止

又方

黃連

六分

牛膝

甘草

各四分每一分二錢半也

右細切以水四升煮取二升洗日三四度瘥

又方

亂髮

青皮

二味燒灰敷之

又方

用熟艾葉裹一團然後以綿裹內陰中

集驗方

療女人交接陽道違理及他物所傷犯血流瀝不止者

取釜底墨斷胡蘆塗藥內之

又方

療女童交接陽道違理血出不止用燒髮并青布末為粉

以何物調塗之

溫養其陰則陽舒而血矣
蓋寒則氣閉故致傷病

按此方婦人痛之故乃肝陽不足宜養肝之陽以陰主陽主開也

傷丈夫則淫慾過也或肝陰不足歟此方既補肝陰復壯肝氣服之自効

塗之。一方割雞冠血塗之。一方以赤石脂末搽之。一方五倍子末搽亦良。

白小戶癩痛

甘草

生薑

各五分

白芍藥

四分

桂心

二分

右剉以水二升煎四沸服

又方

海螵蛸煨為末酒調服方寸匕日三服

又方

小麥甘草二味各等分煎湯洗甚効

○治傷丈夫頭痛

集驗方

療女人傷丈夫四肢沉重嘔吸頭痛

生地黄

八兩

芍藥

五兩

甘草

三兩

香豉

一升

葱白

一升

生薑

四兩

右以水七升煮取二升半分三服不得重作忌房事

此溫中藥也
於治嘔悶
且至頭痛而
用桑皮則其
為之解

桑白皮湯

治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶

桑白皮

兩半

黃連

桂心

五寸大棗

二十枚

右切以酒一斗煮三四升去滓分溫服衣適厚薄毋令汗出

○附治脚痺

金蓮穩步膏

治婦人脚指縫壞痛

黃蓮

黃柏

黃丹

荆芥

微炒各等分

右為細末搽脚指縫內布扎縛自然平穩不痛

濟陰綱目卷之七終

濟陰綱目卷之八

關中 武之望叔卿父輯著 武林 何應魁斗文父訂正

西陵 汪 洪瞻漪子箋釋 天都 查 望于周父泰閱

○胎前門上

○論胎屬十二經所養

手少陰動脈
肘在神門於
左右手掌後
內側橫紋下
與開相對者
是也
尺脈更真

虞氏曰脈經云診其脈手少陰之脈動甚者姪子也蓋手少陰心
脈也心主血脈故也又腎為胞門子戶尺中腎脈按之不絕當姪
子也又曰婦人妊娠一月之時足厥陰脈養之二月足少陽脈養
之三月手少陰脈養之四月手少陽脈養之五月足太陰脈養之
六月足陽明脈養之七月手太陰脈養之八月手陽明脈養之九
月足少陰脈養之十月足太陽脈養之是以諸經脈各養三十日

如此治皆得法

也。若夫至期當養之經虛實不調則胎孕爲之不安甚則下血而墮矣。夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少氣多血手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血多安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之庶無胎墮之患其或感冒風寒別生異証又宜各按法而調治之

○論治胎產三禁

厥陰肝木乃風化之始故曰化之源而祖氣乃人血之氣非穀氣也東方生風風生蟲人亦裸蟲也故從厥陰風木論

源古云治胎產之病從厥陰經論之是祖氣生化之源也厥陰與少陽相爲表裏故治法無犯胃氣及上一焦有三禁不可汗不可下不可利小便發汗則傷上焦之陽利大便則脈數而動脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯此三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴則白虎氣弱則黃耆血刺痛而和以當歸腹

中疼而加之為藥大抵產 天行從增損柴胡雜証從增損四物

宜詳察脈証而用之

○論胎前調理法

心藏神腎主
骨脾主肉故
云然

胎前藥最忌
群隊故不必
多

集略云母之腎臟係於胎是母之真氣子之所賴也受姪之後宜
令鎮靜則血氣安和須內遠七情外薄五味大冷大熱之物皆在
所禁使霧露風邪不得投間而入亦不得交合陰陽觸動慾火務
謹節飲食若食塊缺唇食太飽食雜魚而致瘡癰心氣大驚而
顛必腎氣不足而解顧脾氣不和而虛瘦心氣虛之而神不足見
從母氣不可不慎也苟無胎痛胎動瀉痢及風寒外邪不可輕易
服藥不得已者審度疾勢輕重藥性高下不必多品然父少母老
產女必羸母壯父衰生男必弱氣受偏痺與之補之補羸女則美

出遺書乃至
言也

知七損八益
之理者能道
此

氣實者宜清
熱養血氣虛
者宜理氣安
胎氣虛者宜
補

血壯脾補弱男則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男及待壯而婚。昔人論年老有子者男不過八八女不過七七則知血氣在人。因自有量。夫豈逃陰陽之至數哉。

○論胎前用藥法

丹溪曰胎前當清熱養血。○產婦因火逼動胎逆上作喘急者急用條芩香附之類為未調下條芩水中取沉者為佳。○黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行。○天行不息所以生生而無窮芩芩子治血行氣有神陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛難產可煎作膏。○條芩白朮乃安胎之聖藥俗以黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經而不妄行乃能養胎。○懷妊嗜物乃一臟之虛如愛酸

使血循經而不妄行乃能養胎○有孕八九個月必用順氣須用枳
物乃肝臟不能養胎而虛也○穀紫蘇梗○

○孕婦食忌

雞肉合糯米食令子生寸白蟲○食犬肉令子無聲○鯉魚同雞
子食令子生瘡多瘡○食兔肉令子缺唇○食羊肝令子多厄○
食鼈肉令子項短縮頭○雞子與桑椹同食令子側生心寒○鮮
魚同日雞食令子疳癰○雀肉同豆醬食令子面生黥黥黑子○
食螻蛄令子橫生○食生薑令子多指○食水漿令絕產○食雀
肉飲酒令子多淫無恥○食茨菰消胎氣○食驢馬肉過月難產○
○豆醬合藿香食之墮胎○食山羊肉令子多病○食魷魚無鱗
魚難產○食諸般菌生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目○

此藥外或有
未盡者可以
類推

○孕婦藥忌

歌曰：蛇蛻水蛭及蠱蟲，烏頭附子配天雄。
野葛水銀并巴豆，半膠薏苡與蜈蚣。
三棱代赭并花麝，大戟蛇脫黃雌雄。
芽硝芭硝并皮朴，槐花牽牛皂角同。
半夏南星與通草，瞿麥乾薑桃仁通。
礪砂乾漆，螻蛄瓜地膽，茅根莫用好。

○孕婦起居忌

便產須知云：勿亂服藥，勿過飲酒，勿妄針灸，弗向非常地，便勿舉
重登高涉險，心有大驚，犯之產難，子必顛癇，勿多睡臥，時時行步，
勿勞力過傷，使腎氣不足，生子解顛，腦破不合，衣母太溫，食母太
飽，若脾胃不和，榮衛虛怯，子必羸瘦多病，自家及隣家修造動土，
犯其胎氣，令子破形殞命，刀犯者，形必傷，泥犯者，穀必塞，可擊者，

犯其胎氣令子破形如刀犯者形必危矣犯者必死可畏也
色青黯繫縛者相拘攣有此等驗如影隨形切宜避之

○候胎法

脈經曰婦人懷軀七月而不可知時時衄血而轉筋者此為軀也

衄時噓而動者非軀也○素問云婦人足少陰脈動甚者姪子也

○陰搏陽別謂之有子王註云陰謂尺中也搏謂搏獨於手也此脈搏擊與寸脈別則謂有孕之兆

脈經曰姪脈初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重以

手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也

○尺脈左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀

○婦人姪娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女俱疾為生二

子王子亨云姪娠三部俱滑而疾在左為男在右為女○遣姪娠人而前行還復呼之左廻

首者是男右廻首者是女○看上圖時夫從後嚮呼之左廻首者

胎在尺脈的
是至倫然于
王子亨之說
亦為厚考

素問以足少
陰脈動甚為
有妊脈經以
手少陰脈動
甚為有妊豈
心腎同一診
耶此只言素
問蓋亦有見
實享妙

是男右廻首者是女也。○婁全善云按丹溪云男受胎在左子宮女受胎在右子宮斯言大契是說也。蓋男受胎在左則左重故廻首時慎謹重處而就左也。女胎在右則右重故廻首慎謹重處而就右也。推之於脈其義亦然。胎在左則血氣護胎而盛於左故脈亦從之而左疾爲男。左大爲男也。胎在右則血氣護胎而盛於右故脈亦從之而右疾爲女。右大爲女也。亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處在臍腹之下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脈鼓搏有力而與陽之寸脈殊別也。又如癰節發上則血氣從上而寸脈盛發下則血氣從下而尺脈盛發左則血氣從左而左脈盛發右則血氣從右脈盛也。丹溪以左大順男右大順女爲醫人之左右手蓋智者之一失也。

丹溪以此脈
男女之病原
不胎產婦須

用藏血今胎主氣血爲榮分氣爲衛陰陽配偶不容差兩脈通和

○診婦人有妊娠

肝藏血。心主氣。血爲榮。氣爲衛。陰陽配偶。不參差。兩臟通和。皆類例。血衰氣旺。定無娠。血旺氣衰。應有體。○寸微關滑。尺帶數。流利往來。并雀啄。小兒之脈已見形。數月懷胎。猶未覺。○左疾爲男。右爲女。流利相通。速來主。兩手關脈大相應。已形亦在前。通語。○左手帶縱。兩個男。右手帶橫。一雙女。左手脈逆生三男。右手脈順生三女。○寸關尺部皆相應。一男一女分形証。有時子歟。母身存。或卽母亡存子命。○往來三部通流利。滑數相參。皆替替。陽實陰虛。脈得明。遍滿胸臆。背逆氣。○左手太陽浮大男。右手太陰沉細女。諸陽爲男。諸陰爲女。指下分明。長取記。○三部沉正等無疑。尺內不止。直胎婦。夫乘妻分縱氣。妻乘夫分橫氣。助子乘母兮逆。

氣參母乘子令順氣。○小兒目足胎成聚身熱脈亂無所苦汗出不食吐逆時精神結鬱其中住。滑疾不散胎三月但疾不散五月母強緊牢強滑者安。沉細而微歸泉路。神方驗胎散。婦人兩三個月月經不行疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗。

真雀腦膏一兩

當歸全用重一兩者只用七錢

右二味爲細末分作二服濃煎好艾湯一盞調下或好酒調服亦得。可待三兩個時辰聞覺臍腹微動仍頻卽有胎也。動罷卽愈安穩無所如不是胎卽不動所滯惡物自行母亦安也。如服藥不覺效再煎紅花湯調下必有神効。

驗胎方

經脈不行已經三月者

驗胎方 經脈不行已過二月者

用川芎為細末濃煎艾葉湯空心調下二錢覺腹內微動則有胎也。否則為經滯。

艾醋湯 如過月難明有無或月數未足難明

用好醋煎艾服半盞後腹中若大痛是有孕不為痛定無

探胎散 婦人胎氣有無疑似之間以此探之有胎則吐無則不

吐

皂角法 去皮 甘草 炙各一錢 黃連 五分

右為細末作一服酒酒調服

逐月養胎法

北齊名醫徐之才云妊娠一月名胎胚飲食精熟酸羹受御宜食大麥毋食腥辛是謂總正。○妊娠一月足厥陰脈養不可針或其

皂角探胎未有不吐但恐胃弱之婦即無胎亦不免於吐耳

齊全圖目

逐月養胎法

木

經如大敦行間太衝中封
五里中郊等穴是也。足厥陰內屬於肝肝主筋及血二月之

時血行否。不為力事寢必安靜無令恐畏。

妊娠二月名始膏。無衣辛臊居必靜處。男子勿勞。百節皆痛是為

胎始結。

○妊娠二月足少陽脈養。不可針灸其經。

如膽窠血虛付陽經骨外立陽

陵泉等穴是也。足少陽內屬於膽膽主精。二月之時見精成於胞裏當慎

謹勿驚動也。

妊娠三月名始胎。當此之時未有定儀。見物而化。欲生男者操弓

矢。欲生女者弄珠璣。欲子美好數視璧玉。欲子賢良端坐清虛。是

謂外象而內感者也。

○妊娠三月手心主脈養。不可針灸其經。

如中

衝勞宮大陵內關間使

郄門曲澤等穴是也。手心主內屬於心。毋悲哀思慮驚動。

妊娠四月始受水精以成血脈。食宜稻粳羹宜魚鴈。是謂盛血氣。

此謂胎前等穴是也。○手少陽內輪二在第四月之時見六腑順氣常

維振四月始受水精以成胎脈宜細便養去且魚鱗是謂成胎三月

以通耳目而行經絡○娠振四月手少陽脈養不可針灸其經開

衝陽地內開三陽天手少陽內輪三焦四月之時見六腑順成當

靜形體和心志節飲食

娠振五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚

其衣服朝吸天光以避寒殃其食鰾麥其羹牛羊和以菜蕒調以

五味是謂養氣以定五臟○娠振五月足太陰脈養不可針灸其

經隱泥大都公孫齊丘三陰足太陰內輪于脾五月之時見四肢

皆成男太饑男甚飽男食乾燥男自炙熱男大勞倦

娠振六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數

觀走犬及視走馬食宜鷄鳥猛獸之內是謂變腠理初筋以養其

力以堅骨髓○娠振六月足陽明脈養不可針灸其經知萬見豐隆陰市土

下廉三里足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調等穴是也

五味食甘美毋太飽

妊娠七月始受水精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以

運血氣居處必煖飲食避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅

商○妊娠七月手太陰脈養不可針灸其經如少商魚際列缺尺澤天府等穴是也

手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭

無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠八月始生土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理

而光澤顏色○妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經如商陽二

下廉三里曲池肩井肩髃等穴是也手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅

皆成無食燥物無輒失食無忍大起

滯自持而待之是謂養毛髮致才九○妊娠九月足少陰脈養其不

妊娠九月始受石精以成皮手。六腑百節莫不畢備。飲醴食甘。經
滯自持而待之。是謂養毛髮。致才力。○妊娠九月。足少陰脈衰。不
可針灸其經。如湧泉然谷太谿交信築嶺伏溜等穴是也。足少陰內屬於腎。腎主續縷。
九月之時。鬼脈續縷皆成。無虛冷無苦炙衣。
妊娠十月。五臟俱備。六腑齊通。納天地氣於丹田。故使開節人神
皆備。但俟時而生。

妊娠一月始胚。二月始膏。三月始胞。四月形體成。五月能動。六月
筋骨立。七月毛髮生。八月臟腑具。九月穀氣入胃。十月諸神備。即
產矣。宜服附胎藥。八月即服。

烏雌雞湯。妊娠一月。陰陽新合為胎。寒多為痛。熱多卒驚。舉重
腰痛。腹滿。胞惡。卒有所下。當預安之。宜服此。

胎始一月生
氣方濃傷之
則薄矣故用
溫升之藥以
助之然於丹
黃清熱養血
之語須看

烏雞雞

一隻如食法

茯苓

阿膠各二兩

吳茱萸一升

人參

麥門冬

五合去心

白朮

芍藥

各三兩

甘草

生薑

各一兩

右咬咀以水一斗二升煮雞汁取六升去雞下藥煎取二升內酒三升并膠烺盡取三升每服一升日三

補胎湯

若曾傷一月胎者當預服此

細辛

一兩

防風

二兩

乾地黄

白朮

生薑

四兩

吳茱萸

大麥

各五合

烏梅一升

有咬咀以水七升煮取二升半分三服失食服○寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根二兩○若有所思加栝子人參○一方有人參二兩

艾葉湯

妊娠二月陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風

艾葉湯 妊娠二月陰陽胎動有寒多逆或不成有熱即去

寒有所動搖心滿臍下懸急腰背强痛卒有所下乍寒乍熱宜服此。

麻黃之用非

艾葉 丹參

當歸

麻黃

各一兩

人參

阿膠

各三兩

風寒者不可即果有

甘草

二兩

生薑

六兩

大棗

十二枚

之亦不可宜酌

右咬明以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服

○一方用烏雌雞一隻煮汁並頭血煎藥

黃連湯 若胃傷二月胎者當預服此

黃連

人參

各一兩

吳茱萸

五合

生薑

三兩

生地黃

五兩

一方用阿膠

一方用當歸

各半兩

右咬明以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一修合

若頗覺不安加烏梅一升水煎不用漿

生地為君黃連為臣似大寒疾而又佐以姜萸豈非中和之劑乎至於酢漿煮法并晝夜服法仙佳

雄雞湯。妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃

卒驚熱意愁嘔怒喜。動於經脈。腹滿。繞臍苦痛。或腰背卒

有所下宜服此。

雄雞一隻法如食法

黃芩 白朮

生薑各一兩

麥門冬五合

芍藥 人參

茯苓 甘草

阿膠各二兩

大棗十二枚

右咬咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥煮取半內清酒三

升并膠煎取三升分三服一日令盡。一方用當歸川芎各二

兩不用黃芩生薑。

扶神湯。若胃傷三月胎者當預服此。

扶神 丹參

龍骨各一兩

人參

當歸

阿膠

甘草各二兩

大棗二十枚

赤小豆二十粒

○腰痛者加桑寄生二兩

有寒有熱卒風寒或驚動是山症矣兩以之乃治之何耶總之有人參麥前歸甘等藥以值其本則雖有雜症之來餘藥自能調之

右咬咀以酢漿一斗者取三升分四服先日服七日後服一劑

○腰痛者加桑寄生三兩深師有薤白二兩麻子一升

菊花湯 妊娠四月有寒心下惛惛欲嘔胎膈滿不欲食有熱小

傾難數數如淋臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀

腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服此

菊花雞子大一枚 麥門冬一升 人參一兩 甘草當歸各二兩

麻黃 阿膠各二兩 半夏四兩 生薑五兩 大棗十二枚

右咬咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三

服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日○一方用烏雌雞一隻

煮汁煎藥

調中湯 若質傷四月胎者當預服此

齊金固目

卷八 逐月養胎法

十

白朮 枳實 李根白皮 厚朴 柴胡各三兩 白芍藥

生薑各四兩 當歸一兩 芎藭 續斷 烏梅升 甘草各二兩

右咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日後復服一

劑

阿膠湯 妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便

數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶顛欲仆卒有

所下宜服此

阿膠四兩 人參一兩 當歸 芍藥 甘草 黃芩各二兩

麥門冬一升 吳茱萸七合 旋覆花二合 生薑六兩

右咬咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升

半分四服日三夜一先食服便愈不差再服○一方用烏雄雞

升半分四服

一隻割取咽血內酒中以水煎雞升煎減半內酒升膠煎取三升半分四服。

安中湯。若曾傷五月胎者當預服此。

黃芩一兩 當歸 芎藭 乾地黃 人參各二兩 甘草

芍藥各三兩 麥門冬 五味子 大麻仁各五兩 生薑六兩

大棗三十枚

右咬咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七

日復服一劑。

麥門冬湯。妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脉滿身體

腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服此。

麥門冬一升 人參 甘草 黃芩各二兩 乾地黃三兩

此方似與驚怖卒有所下

婦人云同耳

婦人逐月養胎法

七

以下諸症相
宜若腹滿
腫自右正方

呵膠四兩

生薑六兩

大棗十五枚

右以水七升者減半內清酒二升并膠煎取三升分三服中間

進糜粥○一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

柴胡湯 若曾傷六月胎者當預服此

柴胡四兩

乾地黄五兩

白朮

芍藥一作紫葳

芎藭

麥門冬 甘草各二兩

薤白一兩

生薑六兩

大棗三十枚

一方有黃芩二兩

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一申間進糜粥勿食生
冷及堅硬之物七日更服一劑

葱白湯 妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷服若

傷寒煩熱腹滿氣短常苦頸項及腰背強

黃芩二兩

阿膠四兩

麥門冬

半夏各一

生薑八兩

此方如生
華六兩然非
真若傷寒煩
熱氣血兩虛
者不可輕用

病在肺肺之
用正有散以
下諸藥皆補
肺而溫散酸
收者也甘草
梗米又補土

葱白三四寸長 黃芩一兩 當歸 甘草各三兩 人參一兩
阿膠四兩 麥門冬 半夏各一升 生薑八兩

旋覆花二合

右咬咀以水二升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一
升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法
若秋後勿強責汗○一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮
雞取汁以煎藥

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服此

杏仁 甘草各二兩 紫苑一兩 鍾乳 乾薑各二兩

麥門冬 吳茱萸各一升 五味子三合 梗米五合

右咬咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七

生金之藥

日服一劑。一方用白雞一隻煮汁煎藥。

芍藥湯。

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動

不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或

時寒慄腰背苦冷而痛目眈眈。

補土生金散
寒除痛

芍藥

生薑各四兩

人參

白朮

當歸

甘草

各三兩

厚朴

五兩

薤白

切一升

右咬咀以水五升清酒四升合煮取三升分四服日三夜一。

一方用烏雞雞煮汁以前煎藥。

葵子湯。

若脾胃傷八月胎者當預服此。

葵子

二升

芍藥

四兩

白朮

柴胡

各三兩

厚朴

甘草

各二兩

生薑

六兩

大棗

二十枚

八月用葵子
當忌之

用烏雞雞一佳煮汁煎藥

右吸咀以水九升煮取三升分三服日三凡十日一劑○一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

半夏湯 妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣宜服此

半夏 麥門冬 吳茱萸 當歸 阿膠

各三兩

乾薑 一兩 大棗 十二枚

九月獨言痢 且日四服即止必有所見 然藥品燥熱 用宜斟酌

右吸咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫服四服痢即止○一方雌烏雞一隻煮汁煎藥

豬腎湯 若曾傷九月胎者當預服此

猪腎 一具 白朮 四兩 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黄

芎藭 各三兩 附子 中者一枚 大豆 三合 麥門冬 一升

附子安胎亦 是奇局苟非 氣弱胎寒者 不可斷

右咬咀以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服
日三夜一十日更一劑

○惡阻

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也。○千金方云凡婦人虛弱
血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而
毒病阻所謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常但苦沉重
憤悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也
如此經二月日後便覺不通則結胎也。吐病者患心中憤憤頭重
眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉噉酸果食欲臥少
起世謂惡食其至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此
由經血既閉水漬於臍臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻俗為病
然亦間有
不病者又不

所謂胎氣如
便宜服半夏茯苓湯散
後將和丸
痰水消除便欲食也既得

拘於強弱此
何以故即俗
所謂胎氣好

惡阻亦有寒
熱不可不知

血脈不通經絡否滯則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候者
便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水消除飲食也既得
食力休強氣壯力足養胎母便健矣

大全云妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺
肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食醃酸甚者或作寒熱心
中憤悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻但証有輕重耳
經者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方以半夏茯苓湯茯苓
丸專治阻病然此二藥比來少有服者以半夏有動胎之性蓋
胎初結慮其易散不可不謹也張仲景傷寒論有用黃龍湯者小
柴胡湯中去半夏是也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散
局方則有人參丁香散楊振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾

醒脾二字是
以盞之也

飲皆不用半夏用之多効。
李茂翁云若左脈弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸原藥則愈。
經云無陰則嘔是也。

薛氏云前證若中脘停痰用二陳藥加枳殼若飲食停滯用六君

子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼

氣腦加枳殼胸膈痞悶更加蘇梗脇痛再加柴胡若飲食少思用

六君子加紫蘇枳殼頭暈体倦用六君子湯若脾胃虛弱嘔吐不

食用半夏茯苓湯蓋半夏乃健脾氣化痰滯之聖藥也脾胃虛弱

而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安必用半夏茯苓湯倍加白

朮然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予常用之驗

半夏茯苓湯治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食

半夏湯治七少白朮
陳皮各一熟地黃
去之
旋覆花

有熱是內熱
有客熱是利
熱性心炒用
即不墮服然
非真腹冷下
利者不宜
加大黃又是
一案

鹹酸多臥少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏湯洗七少薑汁炒黃

白朮

陳皮各一錢

熟地黃响清者去之

旋覆花無痰

用延不

桔梗

人參

芍藥

川芎

甘草

各五分

右咬咀加生薑三片水煎空心服兼服後茯苓丸○千金方無

旋覆花有紫蘇葉細辛○有熱加黃芩○有客熱煩渴口瘡去

橘皮細辛加前胡知母各七分半○若腹冷下利去地黃加炒

桂心五分○若胃中虛熱大便秘小便赤澀去地黃加大黃七

分半黃芩一錢

陳皮半夏湯治懷妊氣血不足胎氣始盛逆動胃氣惡阻嘔吐

不進飲食

陳皮

去白湯洗水炒

茯苓各一錢

半夏

製一錢半

子芩

滑姜汁炒

枳殼

麩炒

補脾利氣行
痰水

此方有辛散
酸收之妙

紫蘇各八分

甘草炙五分

右切一劑生薑三片水一鍾煎七分食遠溫服

旋覆花湯 療妊娠六七月間胎不安常處亦治阻病

旋覆花五分

白木

厚朴

枳殼

黃芩

茯苓

各一錢五分

半夏 芍藥

生薑各一錢

右咬咀作一服水煎食前溫服

縮砂二陳湯 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 陳皮去白

砂仁炒各一錢

白茯苓二錢

甘草炙五分

右加生薑三片棗一枚烏梅肉少許水煎服一二劑後服茯苓丸

參橘散 治妊娠惡阻吐逆痰水不食心虛煩悶

重任心煩煩
關改用麥門
竹茹

此方清而不
寒自是一法

清肺胃降逆
氣散滯氣而
不用生夏又
是一法

人參 橘皮

去白

茯苓

麥門冬

去心 白朮

厚朴 薑汁炒

甘草 炙五錢

右作一服加生薑七片竹茹如彈子大水煎服

青竹茹湯

妊娠惡阻嘔吐不食

竹茹

彈子大一團

橘皮

白茯苓

各一錢半夏湯泡七次

生薑

各二錢

右剉水煎溫服忌羊肉鰕鮓等物

蘆根湯

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生蘆根

七分

橘紅

四分

生薑

六分

檳榔

二分

枇杷葉

三分

右切以水二盞煎七分空心熱服

一方

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹

麥門冬

各三兩

前胡

二兩

橘皮

一兩

蘆根

一兩

如神效四肢煩熱加地骨皮一兩

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前

人參半夏丸 治妊娠惡阻酸心胸腹冷痛吐逆不食

人參

半夏

湯泡七次

乾生薑

各半兩

生地汁浸蒸餅法不特制半夏之燥而又傷血分妙製

右為末以生地黃汁浸蒸餅為丸如桐子大每服四十九米飲下○樓氏曰大全方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此而用於此方乎予治妊娠阻病累用半夏未嘗動胎也經云有故無殞是也

茯苓丸 治妊娠惡阻心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓湯兩

劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

炮

半夏

洗七次焙

陳皮

各一兩

前方用乾生薑此用炮薑

右為細末煉蜜丸加糯米大每服五十九空心米飲下日三服

又用佳心亦
大熟矣而炮
而生又復有
別不可不知

乾葛根 白朮 甘草炙

枳殼去白 黃芩各二兩

右爲細末。煉蜜丸。加桐子大。每服五十丸。空心米飲下。日三服。

○二方加麥門冬。○肘後方加五味子。

歸原散。治妊娠惡阻。嘔吐不止。頭痛。全不八食。服諸藥無效者。

人參

甘草

川芎

當歸

芍藥

丁香

各半

白茯苓

白朮

陳皮

各一兩半

桔梗

炒

枳殼

炒各二錢半

半夏

洗炒黃

石咬咀。每服三錢。用生薑五片。棗一枚。水煎服。

橘皮湯。

治妊娠嘔吐不下食。

橘皮

竹茹

人參

白朮

各二錢

生薑

一錢

厚朴

二錢半

右剉水煎服。

惡阻惡食。黃之脾虛。嘔吐責之有火。所謂諸逆衝上。皆屬於火。

也。此方竹茹能平少火。厚朴能下逆氣。橘皮生薑所以開胃。人參白朮所以益脾。開胃益脾欲其安穀云爾。

白朮湯 治胃虛惡阻吐水甚至十餘日水漿不入者。

白朮炒 人參五錢 丁香二錢 甘草一錢

石為細末。每服二錢。加生薑五片。水煎食前溫服。

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒吐逆。翻胃吐食。及心腹刺痛。

人參五錢 丁香 藿香各二錢半

右咬咀。每服五錢。水煎服。

二香散 治妊娠胎動不安。氣不开降。嘔吐酸水。起坐覺重。

香附子一兩 藿香葉 甘草各二錢

石為細末。每服二錢。沸湯調下。不拘時。

以上四散保方

白朮

人參

紫蘇

清皮

川芎

石為細末每服二錢酒送下不拘時

白朮散 治妊娠胎氣不和 不進飲食

白朮炒

人參

紫蘇各一錢

青皮去白

川芎

以上數條方
法俱備

訶子各八分

甘草各五分

右咬咀作一服加生薑三片水煎服

保生湯 治妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參錢一

白朮炒

甘草炒

香附

烏梅一方作烏藥

橘紅各五分

右剉加生薑水煎服。覺惡心嘔吐加丁香

縮砂散 治妊娠胃虛氣逆嘔吐不食

縮砂仁為末每服二錢生薑或米飲調服

○胎動不安

大全云。妊娠胎動不安者。由衝任經虛。受胎不實也。亦有飲酒。居
室過度。損動不安者。有誤擊觸而胎動者。有喜怒氣字不舒。傷於
心。肝觸動血脈者。有信醫。且服煖補。反為藥所害者。有因母病而
胎動者。但治母病。其胎自安。有胎不堅固。動及母疾。但當安胎。其
母自愈。當以母形色察之。若面赤舌青。鬼死母活。面青舌赤。口中
沫出。母死子活。若唇青兩邊沫出者。子母俱死。

安胎散 妊娠常服安胎

白朮

當歸各一錢

黃芩

各五分

甘草

炙五分

健脾胃血清
大調衛任自
足胎孕自安

右剉水煎服。○如腹脹加神麴麥芽各二分半。○氣虛泄瀉加
人參三分。陳皮二分。○潮熱加柴胡一錢。○氣上逆加枳殼三
分。

白米錢

蒼米湯一常服健脾清熱故胎不動

子芩一兩

白米五錢

右剉水煎服。○一方芩米各半兩加當歸二錢。○一方用芩木等分爲末粥丸桐子大每服五十丸白湯下名安胎丸。

金匱當歸散

此方養血清熱孕婦宜常服之。如瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之以清其源而無後患也。

當歸

川芎

白芍藥

黃芩各一兩

白朮二兩

右爲末每服二錢酒飲調服。日再服。或用酒糊爲丸如桐子大每服五十丸茶湯在下。日三服。

釣藤湯

治妊娠八九月胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者此由勞

動用力以傷胎宜急治之。

鉤藤寄生膏
肝兼補氣血

釣藤鈎

當歸

茯神去木

人參各一錢

桔梗五分

桑寄生五分

右剉水煎服。○一方加石膏二錢半

十聖散 治因母疾病氣衰血少不能護養其胎以致不安者宜

此主之即十全大補湯加減

人參

黃耆

白朮

地黃

砂仁各五分

甘草炙

當歸

川芎

芍藥炒各一錢 川續斷八分

右剉水煎服

黃耆湯 治胎動不安腹痛下黃汁

黃耆

川芎各一兩

糯米二合

右細剉水一盞煎至一盞三分溫服

血氣之不足

痛不已用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便下

之陰所以補血氣之不足也
乘天行之健

阿膠益金固
血艾葉助陽
上升則不
墜固則不
故三方皆用之

佛手散

治妊娠因事藥積胎動不安或子死腹中惡露不下疼

痛不已用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便下

當歸

去蘆酒
浸三錢

芎藭二錢

右剉先用酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

小膠艾湯

治傷損動胎下血腹痛

阿膠

炒成珠
一兩

艾葉二兩

右剉水煎服○指迷方加秦艽二兩

膠艾歸湯

治妊娠二三月上至八九月頓仆跌胎動不安腰

腹疼痛欲死已有所下

阿膠

川芎各三兩

當歸

乾地黃

艾葉各二兩

一方有甘草無地黃

李金蘭

胎動不安

下

右細切以水七升煮取三升半分三服

呵膠散 治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰腹痛疼或有

所下

阿膠

蛤粉炒成珠

艾葉

炒

當歸

酒浸

川芎

白芍藥

炒

熟地黃

洗

黃耆

甘草

炙各一錢

右咬咀加生薑五片棗二枚水煎空心服

當歸湯

治妊娠胎動澀心煩燥悶絕口乾橫生逆產上衝下築

迷悶唇口青黑手足冷厥

當歸

人參

各二兩半

阿膠

炒一兩

甘草

各兩

右咬咀每服八錢加連翹葱白一莖水煎溫服○一方有川芎

○一方有川芎厚朴無甘草

二方平中之
宜奏効最
捷

生地黃

益母草

當歸

黃耆

○一方有川芎、厚朴、無甘草

一方 治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

生地黄

益母草 各一兩

當歸

黃蓍 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑四片煎至六分去渣服無時

三物解毒湯

治誤服毒藥動胎

甘草

黑豆

淡竹葉 各等分

右用水煎濃服

白扁豆散

治妊娠誤服諸般毒藥毒物

白扁豆 生去皮為細末米飲調服方寸七神效或濃煎亦可

治漏下血

妊娠經來

脈經云婦人經月下但為微少師脈之反言有軀其後審然其脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之則滑浮之

則輕陽明少陰各如經法身反癰漸不欲飲食頭痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛當作血盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙妊二胎今陽不足故令激經也滑脈主血有餘今經又少故知孕○大抵妊娠經來不多而飲食精神如故六脈和緩滑大無病者血盛有餘也兒大能飲自不來也

此言漏胎有三衝任虛者血海自虛也七情飲食間

大全云夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脈虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脈為經絡之海起於胞內手太陽小腸脈也手少陰心脈也是二經為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以為乳汁也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏血

氣血失於來

逐致胎動若母有宿疾子虛為風冷所乘氣血失度使胎不安故

實皆四有所
感也。宿疾者
氣血失於榮
養也。

血盡則人斃矣。又有因勞役喜怒憂樂不節飲食生冷觸冒風寒
遂致胎動。若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故
令下血也。

曾有一娠婦月信不絕而胎不損問產科熊宗古答曰婦人血盛
氣衰其人必肥既娠之後月信常來而胎不動若晚進觀之便以
為漏胎若作漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮
今推宗古之言誠有旨也。巢氏曰婦人經閉不利別無所苦者是
謂有子以其經血蓄之以養胎壅之為乳汁也有子之後當以養
胎矣豈可復能散動耶所以然者有妊而月信每至是亦未必因
血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮
經為風所勝則所來者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必

漏胎用風藥
亦是升肝
氣使血不漏
則胎自固不
但疎風已也

精悉

孤癰預下必
倚而墮此氣

服保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃所謂實實虛虛也其
胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之理專以一藥治風經信可止
或不服藥胎亦無恙然而有胎本不固而因房室不節先漏而後
墮者須作漏胎治之此又不可不審也

方氏曰胎動胎漏皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹痛爲異爾故
胎動宜行氣胎漏宜清熱

李氏曰尿血白尿門下血漏胎自人門下血妊娠尿血屬胞熱者
多四物湯加山梔炭灰每苦質萊飲亦妙因暑者益元散加升麻
煎湯下稍虛者膠艾四物湯久者用龍骨二錢蒲黃五錢爲末酒
調服

張經曰婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胞必倚而墮此非時

薛氏曰胎漏黃汁下或如豆汁若因肝脾濕熱用升陽除濕湯血

血兩虛也

孤漿預下故也

薛氏曰胎漏黃汁下或如豆汁若因肝脾濕熱用升陽除濕湯血崩肝脾風熱用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯脾胃氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用防風黃芩丸風入腸胃用胃氣湯

加減膠艾湯治胎動漏血有效

阿膠炒成珠

當歸

川芎

白芍藥炒

地榆各一錢

艾葉炒

甘草各五分

右剉一服水煎饑服○胎漏血多起於氣惱血逆火動之故可加炒黃芩炒香附炒砂仁研細同煎○或有受胎至四五個月卽墮或至六七個月漏血要墮者宜前方去艾葉地榆加白朮

黃芩茯苓熟地黃續斷○有氣盛亦加香附砂仁○氣虛加入
參黃耆之類○如傷冷多次受孕後便宜服千金紫蘇飲及前
加減法湯丸相間庶免再墮

安胎飲 治妊娠卒然腰痛下血不已

當歸 川芎 白芍藥炒 熟地黃 阿膠炒

艾葉 黃耆各一錢 甘草炙 地榆各五分

右剉一劑加薑棗水煎服

太全方 治妊娠三四月腹痛時時下血

當歸 熟地黃 艾葉各六兩 續斷二兩 阿膠

雞蘇 竹茹各一兩

右用水一升煎取七合空心再服

鯉魚反 當歸畏 白芍藥 熟地黃 川芎

右用水一升煎取七合空心再服

鯉魚皮之用

如聖湯 治胎動腹痛或為胎漏

鯉魚皮

當歸酒

白芍藥

熟地黃酒

川芎

川續斷

酒

阿膠

蛤粉炒

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢加苧根少許生薑五片水煎溫服

安胎當歸湯

治妊娠舉動驚悸胎不安

小腹痛引腰絡下血

當歸

川芎

阿膠

人參

各一兩

大棗

十二枚

艾葉

把

一方有甘草無參朮

右以水酒各三升煮至三升內膠令烱分三服

枳殼湯

治胎漏下血及因事下血

枳殼

去穢

黃芩

各半兩

白朮

一兩

白朮為君不用血藥是

右剉水煎食前溫服○一方加生地八少酒煎

當歸寄生湯 治妊娠胎漏非時下血

當歸

川芎

艾葉

白朮各一錢 人參

桑寄生

續斷

熟地黃各二錢

右水煎空心溫服

二黃散

治婦人胎漏下血

生地黃

熟地黃各等分

右為細末每服二錢煎白朮枳殼湯調食前服或咬出水煎服

白朮枳殼煎湯調地黃末意竟起早

阿膠散

治妊娠無故卒然下血

阿膠

蛤粉炒成珠二兩為末

生地黃

半觔搗取汁

右以清酒三升攪勻溫熱分三服

一方

治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

用清酒炒

右同煎三五沸溫三服以止為度

生地黃汁升

陳酒五合

右同煎三五沸溫三服以止為度

榆白皮散 治妊孕胎漏去血恐其難產宜服之

榆白皮

葵根

大麻仁

瞿麥

各二錢

木通錢二

牛膝

酒浸焙一錢半

右咬咀水煎遍服

一方 治妊娠忽暴下血數升胎燥不安

榆白皮

二兩

熟地黃

四兩

當歸

生薑

各二兩

葵子一升 方不用後

右剉以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服之

子芩散 治肝經有熱妄行下血

齊陰綱曰

胎漏下血

三五

此方治胎燥則可若脾虛滑泄者禁用

細條黃芩炒為末每服一錢以枰鍾燒赤淬酒熱調服若脾胃虛不宜用

防風丸 治肝經不風以致血得風而流散不歸經

防風為末每服一錢白湯調服

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血

條芩炒焦 防風各等分

右為末酒糊丸如桐子大每服三五十丸食遠或食前米飲或溫酒送下

○右三方治肝經風熱之劑

桂枝茯苓丸

仲景云婦人宿有癥病經斷來及三月而得漏下

不止胎動在臍上者為癥癥害姙娠六月動者前三月經水利

下其癥桂枝茯苓丸止之

凡遇此症最宜斟酌

時胎下血者後斷三月經也。所以血不止者其癥不去故也。當下其癥。桂枝茯苓丸止之。張氏曰凡胎動多當臍今動在臍上故知是癥也。

桂枝

茯苓

牡丹皮

桃仁

去皮尖炒

芍藥

各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大。每日食前服一九。不知加至三九。

本事方。治胎漏下血不止。

取桃樹上乾不落桃子燒灰和水服瘥。○本草云桃奴破血

又治伏梁氣積。

○右二方治癥病破血之劑。

入全方。治妊娠忽然下黃汁。中膠或如豆汁等物。或胎動腹痛。

黃耆

炒大兩

糯米

合五

黃赤為熱故用芎根以涼之下黃赤為肝氣之疎泄故重用銀以鎮之

肺虛熱於心於理似皆虛在虛字上有

右以水七升煎取二升分為四服

銀芎酒 治姙娠下黃汗或如赤豆

芎根

去黑皮切二兩

銀五兩或金銀首飾

右用水酒各一大盞煎服

○右三方治漏下黃汗之症

○煩躁

師子煩附日乾

大全云姙娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產寶云夫姙娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也停痰積飲在心胸之間或衝於心亦令煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安也大丹姙娠之人既停

飲而煩者。嘔吐涎沫。惡聞食氣。煩躁不安也。大凡妊娠之人。既值。

痰積飲。又寒熱相搏。氣鬱不舒。或煩躁。或嘔吐涎沫。劇則胎動不
安。均為子煩也。

煩燥最屬
心脾與子煩
大同小異

薛氏曰。前証若因內熱。用竹葉湯。氣滯用紫蘇飲。痰滯用二陳白
水。黃芩枳殼。氣鬱用分氣飲。加川芎。脾胃虛弱用六君。紫蘇山梔。
大全云。妊娠煩燥。口乾者。是太陰脾經其氣通於口。手少陰心經
其氣通於舌。若臟腑氣虛。榮衛不理。致陰陽隔絕。熱乘於心。脾津
液枯少。故令心煩。而口乾也。與子煩大同小異。且用知母丸。
薛氏曰。前證若胃經實火。用竹葉石膏湯。若胃經虛熱。用人參黃
耆散。若胃經氣虛。用補中益氣湯。若肺經虛熱。用紫蘇飲。若肝經
火動。用加味逍遙散。若脾氣鬱結。用加味歸脾湯。若腎經火動。如
味地黃丸。

竹葉陽 治姙娠心驚膽怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓三錢 麥門冬去心 防風 黃芩各二錢

右作一服加竹葉十片水煎服無時○一方有知母無黃芩○
一方有人參無黃芩○

知母飲 治姙娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

知母 麥門冬去心 赤茯苓各一錢半 黃芩 黃耆各二錢

甘草錢

右作一服水二鍾入桑白皮半錢煎至一鍾再入竹瀝些少同煎一二沸服無時

犀角散 治子煩

犀角尖磨水 地骨皮 條芩 麥門冬去心 甘草五分

右切作一服水二鍾煎八分入竹瀝一合溫服

壅熱用黃芩
要知是虛非
實

赤茯苓各二錢

右切作一服。水二鍾煎八分。入竹瀝一合。溫服。

當歸飲。治子煩。

當歸二錢酒洗

川芎

阿膠珠

豆豉

桑寄生各一錢

川豆豉川芎
散熱。又是一法。

葱白七莖

右剉水煎溫服。

人參散。治妊娠熱乘心脾。津液枯少。煩躁乾渴。

人參

麥門冬去心

赤茯苓

地骨皮

乾葛

黃芩炒

犀角鎊各七錢五分

甘草半兩

右剉。每服三錢。水煎服。

竹茹湯。療妊娠煩躁。或胎不安。

齊集綱目

卷八 煩燥

天

清心涼肝妙劑

用淡青竹茹一兩以水一大升煮取四合徐徐服盡為度
治妊娠心煩熱不止

葱白握一握 豉二分

右以水二大盞煎至一盞半去滓溫分三服

一母丸 治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得眠巢氏謂
之子煩也醫者不知作虛煩治之損動胎氣宜矣

知母洗焙

為細末裹肉丸如彈子大每服一丸煎人參湯

下

○心腹脹滿即子懸

此雖言寒氣停飲所致然大概陽氣壅滯則令上凌

大全云妊娠心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停飲重飲觸冷飲發動與氣相爭故令心腹脹滿也

用一母丸子身皆陽氣壅滯胎上逼心用此蘇飲

心腹故以柴
蘇飲寬氣下
氣為主餘隨
症加減

薛氏曰前証若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散若食傷脾胃
用六君子湯若陽氣壅滯胎上逼心用柴蘇飲
一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加青皮山查枳殼
其脹益甚其胎上攻惡心不食右關脈浮大按之則弦此脾土不
足肝木所侮用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益
氣升舉脾氣而瘥

一妊婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫胃寬氣等藥服之反吐
轉加脹滿奏心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯
其論曰妊婦通身腫滿或心胸急脹名曰胎水遂去妊婦胎前看
之胸肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方
得分娩死胎此証蓋因懷妊腹大不自知覺人人皆謂娠孕如此

終不知胎水之為思也

李氏曰子懸者心腹脹滿痛也。姙孕四五個月以來相火養胎以

致胎熱氣逆。心腹脹滿疼痛。宜紫蘇飲。有鬱心腹脹滿甚者

加莪朮及丁香少許。不食者。煮水湯。倍白朮加芍藥。

火盛極。一時心氣悶絕而死。紫蘇飲連進救之。

此証兩尺脈絕。若有誤服動胎藥。子死腹中。則增寒。手指唇爪俱

青。全以香為証。驗黃歸湯救之。

仲景云。婦人懷妊六七月。脈弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒者。少腹

如扇。所以然者。子藏寒故也。當以附子湯溫其藏。

婦人傷胎。懷身腹滿。不得小便。從腰以上重。如有水氣狀。懷身七

月。太陰當養不養。此心氣實。當刺滗勞宮及關元。小便微利則愈。

附子胎前禁
用而此以治
藏寒正所謂
有故無煩也

以火盛極而
連進紫蘇飲
人恒失之須
知是氣作悶

此紫蘇飲 治胎氣不和氣上心腹脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產

驚恐氣結連日不下 一方無川芎 各七寶散

紫蘇葉二 大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮 各去

當歸 各一 人參 甘草 各五

右剉作一服加生薑三片葱白七寸米煎服

本事方云。曾有一婦累日產不下。服通催生藥不驗。予曰。此必坐草太早。心懷一點懼氣。結而不行。然非不順也。素問云。恐則氣下。蓋恐則精神怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行。得此藥一服便產。及婦人六七月子懸者。用此數數有驗。不十服。胎便近下。

陳方甫治一婦有孕七箇月遠歸。忽然胎上衝心而痛。坐臥不

安兩醫治之無效。遂說胎已死也。用草麻子研爛和麝香調貼臍中以下之。命在垂亡。召陳診視。兩尺脈絕。他脈平和。陳問二醫作何證治之。答曰死胎也。陳曰何以知之。曰兩尺脈沉絕。以此知之。陳曰此說出何經。二醫無答。陳曰此子懸也。若是胎死。却有辨處。面赤舌青。子死母活。面青舌赤。吐沫。母死子活。唇口俱青。子母俱死。今面不赤。口不青。其子未死。是胎上逼心。宜以紫蘇飲治之。至十服而胎近下矣。

訶黎勒散

療妊娠心腹脹滿。氣衝胸膈煩悶。四肢少力。不思飲食。

訶黎勒

赤茯苓

前胡

各一兩

陳皮

大腹皮

桑白皮

各七兩

枳殼

川芎

白朮

各半兩

桑白皮 絡牛 枳殼 川芎 白朮 絡牛

右為粗末每服四錢薑三片棗一枚水煎服

保胎和氣飲 專治胎前四五個月身體困倦氣急發熱飲食無

味貪睡頭暈等証

枳殼四不

厚朴

香附子各三不

砂仁

蒼朮

橘紅名二不

蘇葉不

甘草五不

小茴香一不

右剉分作三服每服用水一鍾半煎七分服

瘦胎飲 專治胎前五六個月胎前困弱體重貪睡食不知味肚

腹胎動

當歸二不

白芍藥

益母草

枳殼各四不

砂仁

香附子

益智各三不

甘草一不

右剉分作三服每服水一鍾半煎至七分空心溫服

樹殼湯 治婦人妊胎腹脹

枳殼三兩

黃芩二兩一方只用一兩

右為粗末。每服五錢。水煎服。○如腹滿身體沉重。加白朮二兩。葱白湯。治胎上逼心。煩悶。又治胎動不安。

葱白安胎人所未知

用葱白二七莖。濃煮汁飲之。若胎未死。即安。已死。即出。未效。再服。○巢全善云。此方神效。脈浮滑者。宜之。本草云。葱白通陽氣安胎。

一方 治胎動上逼心痛

剉在醋煎

取艾葉如雞子大一團。以頭醋四升。煎至二升半。溫服。倉公下氣湯。治心腹兩脇脹悶。飲食少思。四肢無力。

羌活 檳榔 青皮 大腹皮 赤芍藥

生鹿角

續斷

青皮

大腹皮

赤芍藥

甘草

陳皮

赤茯苓

牛黃

桑白皮

桂心

紫蘇葉

石劉加生薑五片棗一枚水煎服

當歸湯 治胎動衝心煩悶欲死安胎止痛

當歸

川芎

人參

阿膠

甘草

連根葱白

右細剉以水二升煎四味至升半去渣下葱再煎減三合八阿

膠溫服一劑分二三服

大聖散 治婦人性悸睡中多驚腹脇膨脹坐臥不寧

白茯苓

川芎

黃蘗

當歸

麥門冬

人參

甘草

木香

齊陰調目

治心腹脹滿

三

此症禁用白
水而此方獨
用白大為君
非此症之確
者不可

右咬咀加生薑五片水煎服

治妊娠逆身痛或衝心欲死不能飲食

白朮五兩

黃芩二兩

芍藥四兩

右用水六升煮取二升半分三服

一方治妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓六分

桑白皮五分

前胡四分

郁李仁

檳榔各三分

右為細末以水一升煮取一半去滓夜臥服

安胎和氣飲治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子麩裏根去核

白朮名二

陳皮去白

高良薑炒

木香不見火

白芍藥

陳米炒

一甘草炙名一不

右作一服生薑五片水煎服忌生冷之物

仲景附子湯 婦人懷妊六七月脹弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒

者少腹如扇所以然者子臟寒故也當以此湯溫其臟

附子二枚炮去皮破八片 白米四兩 茯苓 芍藥 人參二兩

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

心痛

大全云。娠娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛旦發夕死。夕發旦死若傷心支絡則乍寒乍作若傷於子藏則胎動而血下

薛氏曰。前證若飲食所傷用平胃散加枳殼山查若因錯雜諸邪當審其因而治之

一妊婦心痛煩熱作渴用白水散即愈後因停食其痛仍作胸膈

脹滿按之則痛此因飲食停滯用人參養血湯按之不痛乃脾胃受傷以六君子湯補之而愈

一姪婦心腹作痛胸脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山楂山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎動不食面色青黃肝脈弦緊脾脈弦長此肝脈乘土用六君子湯加升麻紫胡木香而愈
火龍散 治姪娠心氣疼

此方治平常
心藏亦效

川棟子

茴香

炒名
三錢

艾葉

鹽炒一
錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

產寶丸

治姪娠卒心煩氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴

製各
一兩

右用水六升煎取三升分三服

右用水六升煎取二升分二服

白朮湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白朮二兩

赤芍藥二兩

黃芩一兩

豈以心痛而可用白朮者詳之

右切以水六升煮取三升半分三服半日令盡微下生忌桃李

雀肉等

千金方 療妊娠心痛

按此可治燥熱心痛

青竹茹一升

羊脂八兩

白蜜三兩

右三味合煎每服棗核大三枚食前頓服日三服

一方 治妊娠忽然心痛悶絕欲死者謂之中惡

生地黄二錢

枳殼一錢

木香三分

右剉煎服

一方

橘皮二兩

豆豉五兩

右為末煉蜜為丸如桐子大溫水下二七丸無時

雜方

青竹茹一升酒二升煮取一升半去滓分溫頓服

二方破雞子一枚酒調服之

二方大麻子三升研水八升煮取五升分五服

補遺

沉香降氣湯

茯苓補心湯

四七湯

此治癆血煩

紫蘇飲皆可用炮炙論云心痛欲死急覓延胡

心腹痛

心腹痛

大全云。妊娠心腹痛者。或由宿有冷疼。或心觸風寒。皆由臟虛而致動也。邪正相擊。而并於氣。隨氣上下。衝於心。則心痛。下攻於腹。則腹痛。故令心腹痛也。妊娠而痛者。邪正二氣交攻於內。若不時差者。其痛衝擊胞絡。必致動胎。甚則墮也。又云。妊娠心腹疼痛。多是風寒濕冷。痰飲與臟氣相擊。故令腹痛攻衝不已。則致胎動也。

薛氏曰。前証若風寒痰飲。用金沸草散。雜病咳嗽。胎氣鬱結。加香附。川芎。若飲食停滯。用六君。加紫蘇。枳殼。若怒動肝火。前藥更加柴胡。山梔。若鬱結傷脾。用歸脾湯。加枳殼。山梔。

一。妊婦心腹作痛。吐痰。惡心。胎氣上攻。飲食少思。此脾虛氣滯而

為痰用六君子加柴胡枳殼諸証漸退飲食漸進又用四君子加枳殼山楂橘梗而安後因怒兩脇氣脹中脘作痛嘔逆嘔吐用六君子加柴胡升麻木香一劑而愈

川芎散 治妊娠素有冷氣忽心腹痛如刀刺

川芎 當歸各一錢 人參 吳茱萸 厚朴薑製各五分

茯苓 桔梗各四分 芍藥七分 枳殼 甘草各二分

石劑水煎稍熱服

當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及產後崩中去血

過多眩暈虛乏

白芍藥炒四兩 當歸 茯苓 白朮各二兩

澤瀉 川芎各一兩

產後忌為藥而此方兼治且以為有患謂產後惟去血過多若可用若患露不

名作痛者不可用也。

胎動方中多用艾葉而此則用白朮者蓋不治痛而治不思飲食也妙在當歸陳皮為君

右為細末每服二錢食前溫調服

阿膠散 治妊娠胎動腹中疴痛不思飲食

當歸炒 陳皮名一兩 白朮 白茯苓 阿膠炒

川芎各七錢半 甘草二錢半

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分服

一方 治妊娠患腹痛并胎動不安

當歸三兩 川芎 阿膠 人參 厚朴各一兩

葱白切一升

右咬咀以水七升煎至三升分三服 一方有甘草無厚朴川

芎

香義散 治妊娠五個月以後常胸膈間氣刺痛滿或腸鳴以至

嘔逆減食此由胃經鬱滯過度飲食失節之所致也蔡元度龍
人有子夫人怒欲逐之遂病醫官王師復處此方三服而愈

廣中莪茂

炒一兩

丁香

半兩

粉草

二錢半

右爲細末空心鹽湯服一大錢覺胸中如物按下之狀

克錄驗方 療姪娠腹內冷痛忽胎動

薤白

升一

當歸

切四兩

右以水五升煮取四升作三服

一方治姪娠胎動欲落腹中痛不可忍

上等銀

斤一

茅根

二斤去黑皮

右以水九升煮銀取五升八清酒一升同煎茅根取三升分三

服立安

銀根解熱護
肝法俱妙
於休弱病
者可用

血熱血虛腹痛若此方甚妙

一方治妊娠痛腹

用生地黃三斤搗酒一升合煎減半頓服愈

一方治妊娠四五箇月忽然腹痛

大棗

十四枚

鹽一錢炒

石為末取一撮許酒調服即愈一方單用棗十四枚燒存性

為末童子小便調下一方單用鹽一斤燒令赤以兩指取一

撮酒調服

腹痛即子痛

仲景云婦人懷胎腹中諸疾痛當歸芍藥散王之脈經曰婦人有

胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者則

男如小雞起者女也冷者何而冷者為死溫者為生

所謂何面者意在腹之左右也

氣虛者可用。

薛氏曰：若腹中不時作痛，或小腹重墜，若胎痛，用地黃當歸湯。未應加參朮陳皮，或因脾氣虛，用四君子加歸地，中氣虛用補中益氣湯。

地黃當歸湯。治婦人有孕胎痛。

血虛痛如。

當歸一兩

熟地黃一兩

右為末，作一服，水三升，煎至一升，去滓頓服。○未效，加入參白

朮陳皮。

加味四物湯。治血少胎痛。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

香附子各等分

右為末，每服三錢，紫蘇湯調下。

小腹痛。

妙法紫蘇湯。

大全去妊娠小腹痛者由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也

薛氏曰前証若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯脾氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安胎飲加升麻白朮不應兼補中益氣湯

一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸証頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

療妊娠被驚胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

川芎

各八分

阿膠

人參

艾葉

各四分

茯苓

大棗

各二十個

右細切以水四升煮取三升酒分三服

補遺方

治妊娠小腹痛胎動不安

川芎爲細末酒調下一方用川芎當歸等分煎服

腰腹及背痛

大全云腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之故腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胞墮也

薛氏曰前証若外邪所傷用獨活寄生湯勞傷元氣用八珍湯加杜仲砂仁阿膠艾脾腎不足以前藥加白朮補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳殼肝火所動用小柴胡湯加白朮枳殼山梔肝脾鬱結用歸脾湯加柴胡枳殼

肝經... 加些柴胡根殼

一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致用拔華羌活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊

汪石山治一婦懷妊八月營病腰痛不能轉側大便燥結醫用人參等補劑痛益加用硝黃通利之藥燥結雖行而痛如故汪診之脈稍洪近駛曰血熱血滯也宜用四物加水香乳沒黃柏火麻仁煎服四五貼痛稍減燥結潤復加發熱面赤或時惡寒仍用前方去乳香沒藥加柴胡黃芩服二貼而寒熱除又背心覺寒腹痛復作汪曰血已利矣可於前方加入參一錢服之而安

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神效

破故紙 瓦上炒香爲末

右先鹽胡桃肉一個爛後以溫酒調下故紙末三錢空心服

五加皮散 治妊娠腰痛不可忍或跨痛先服此散

杜仲四兩炒 五加皮 阿膠炙另 防風 狗脊

川芎 白芍藥 細辛 草薺各三兩 杏仁皮尖麤炒

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服

五加皮丸 治妊娠腰痛不可忍者次服此丸

續斷炒 杜仲各二兩半 芎藭 獨活各三兩 五加皮

狗脊 草薺 芍藥 訶子肉各四兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四十九空心酒下日三服

療觸動胎以致腰痛背痛

杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎

草薺各等分

此與前方不甚相遠而以杏仁易訶子通其寒潤者此宜詳之

右為末每用三錢空心酒調下

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸_{三兩}

阿膠

甘草_{各二兩}

葱白_{切二升}

右細劉以水七升煮取三升去滓分溫三服

小品苧根湯

療損動胎腰腹痛去血胎動向下

生地黄

苧根_{各二兩}

當歸

芍藥

阿膠

甘草_{各一兩}

右細切以水六升煮取二升去滓內膠煎烊分溫三服忌海藻

蕪荑

大地黃丸

治產前後腰腹痛一切血疼兼治血氣虛四肢不舉

骨髓熱疼

熟地黄_{二兩}

烏梅肉

當歸_{各一兩}

此方不特產後妙即平日血虛內熱者亦宜

齊金剛目

卷八腰腹痛

七

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一九空心白湯嚼下

紫酒 治妊娠腰痛如折亦治常人卒腰痛者

大黑豆二合炒令香熟酒一大盞煮取七分去豆空心頓服

雜方

治胎動腰痛捨心或下血取葱白不拘多少濃煎汁飲之

一方用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以角碎爲度取酒

飲之鹿角爲末服方寸匕

一方用葛蒲汁酒一升服之

一方用艾葉一把如雞子大以酒四升煮取二升分爲二服良

○胎水腫滿 卽子腫子滿子氣

產寶論曰妊娠腫滿由臟氣本弱因妊重虛土不克水血散於四

肢。遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜腳腫俗呼爲皺脚亦有通身腫滿心腹急閉名曰胎水。

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃惡濕身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下痢臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭面或手足浮腫也然水漬于胞兒未成形則胎多損壞及臨產日脚微腫者乃胞藏水少血多水出於外故現微腫則易生也宿有寒氣因寒冷所觸故能令腹脹滿腫也。

子氣者因子
而肝脾氣阻
土遂不能生
水故一香附
散足以療之
然不藥亦
無事

產乳集論曰妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來
行步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出
者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任經有血
風未可妄投湯藥亦恐大段甚者慮將產之際費力有不測之憂
故不可不治於未產之前也古方論中少有言者元豐中淮南陳
景初名醫也獨有論治此証方名初謂之香附散李伯時名曰天
仙藤散也

薛氏曰前証若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛
弱佐以四君子若面目虛浮肢體如水氣用全生白朮散如未應
用六君子湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣加茯苓若飲食失
宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫喘悶不安或指縫出水用

子腫與子氣
相類然子氣
在下子腫
在頭面須識

天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應用補中益氣湯若脾肺
氣滯用加味歸脾湯佐以加味道遙散

白朮散治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰子腫

白朮二錢 茯苓一錢 陳皮 生薑皮 大腹皮

桑白皮一錢

右剉水煎服或為細末每服三錢米飲調下○本方去白朮名

五皮散或加木香

木通散治妊娠身體浮腫四肢脹急小便不利

木通 香薷 紫蘇莖葉各一錢 枳殼炒 檳榔

條苓各五分 木香 訶子皮各三分

右剉加生薑三片水煎食前服

補脾瀉肺利
大腸

鯉魚治懷妊
身腫及胎氣
不安食又
下水氣利小
便

葶藶散 治妊娠遍身洪腫

葶藶子一兩 白朮五兩 茯苓 桑白皮 郁李仁各二兩

右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥

千金鯉魚湯 治妊娠腹脹滿或渾身浮腫小便赤澀

當歸 白芍藥各一錢 白茯苓一錢半 白朮二錢

橘紅五分 鯉魚一尾

右作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞半入生薑三片煎至一盞空心服胎水即下如未盡腹悶未除再合一劑服之

一方

澤瀉 葶藶名二兩 茯苓 枳殼 白朮各六兩

子滿大都
五六月以後
病此氣與腫
不同溢胎大
則腹滿滿則
氣浮遍身腫
邪無所挾但
一瀉氣利水
則愈

右剉以水六升煮取二升半分溫二服

防已湯治妊娠脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防已半錢桑白皮炒紫蘇莖葉赤茯苓各二錢木香五分

右剉一服加生薑四片水煎服如大便不通加枳殼檳榔

澤瀉散治妊娠遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀謂之

子滿

澤瀉桑白皮炒木通枳殼炒檳榔

赤茯苓各一錢半

右剉一服加生薑五片水煎服

天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫至腿膝

行步艱難喘悶妨食狀似水氣甚至足指間有黃水出者謂之

子滿

子氣

天仙藤

洗畧炒即青木香藤

香附子

炒

陳皮

甘草

烏藥

木香

各等分一作木瓜

右剉每服五錢加生薑三片紫蘇五葉水煎日三服腫消止藥

產寶方

療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓

四兩

杏仁

各三兩

旋覆花

各三兩

郁李仁

各三兩

右為粗末以水六升煮取二升去滓分溫三服小便通即瘥

崔氏方

療妊娠體腫有水氣心腹急痛

茯苓

白朮

各四兩

旋覆花

二兩

杏仁

黃芩

各三兩

石細切以水七升煮取二升半分溫三服忌桃李雀肉酢物

腎着湯

治妊娠腰脚腫

以下三方不甚相遠但郁李與白朮補濕不同黃芩與乾薑冷熱不同而旋覆散結痰杏仁瀉肺氣亦略相似惟在用者卷之

腎着湯 治妊娠腰脚腫

茯苓

白朮

各二錢

乾薑

強

甘草

各一錢

杏仁

半錢

石咬咀水煎服

子和方

治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴

猪苓五兩為末以熱水調服方寸七日三服

即仲景猪苓湯法而服法更巧

腹哭鐘鳴

產寶方

治小兒在腹中哭及孕婦腹內鐘鳴

用空房下鼠穴中土一塊令孕婦噙之即止或為末入麝香

少許酒調下二錢立愈然麝香開竅當酌量用之

補遺方

治孕婦腹中見哭

用黃連濃煎汁母常呷之即止

一法

小兒腹哭者蓋臍帶上疙塔見含口中因娠婦登高舉臂

有令孕婦以
筭箒掃地即
止者亦此意

脫出兒口以此作聲令姪婦曲腰就地如拾物仍八兒口即止
積聚

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞帝曰願聞其故
岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

丹溪方 治血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附子

醋炙四兩

桃仁

去皮尖一兩

海粉

醋炙二兩

白朮

一兩

右為末麴糊丸服

